

腹腔鏡下胆嚢摘出術 (手術3日前～術当日)

手術日: 平成__年__月__日

函館市医師会病院外科・2階病棟

患者: _____ 様 _____ 歳

主治医: _____

感染症 () ワ氏 HBS HCV MRSA

身長 cm 体重 kg

					手術3日前	手術2日前	手術前日	手術当日(手術前)	
					月 日	月 日	月 日	月 日	
バイタルサイン	T	P	R	BP					
	40	110	40	180					
	39	100	35	160					
	38	90	30	140					
	37	80	25	120					
	36	70	20	100					
	35	60	15	80					
	34	50	10	60					
	安静度					安静度フリー	安静度フリー	安静度フリー	安静度フリー
	食事					食事摂取可	食事摂取可	夕食後から絶食 21時以降水分止め	患者へ絶食の確認
清潔					清拭	清拭	入浴		
排泄	排便 / 排ガス							反応便 (有・無)	
	尿量 / 回数								
治療・処置					手術指示伝票確認 X-p(胸部正面、腹部立位) 採血(CBC、Po-1、血型、感染症、出血凝固) ECG 呼吸機能検査		指示伝票確認 除毛 臍処置 セフメタゾンテスト() プルゼニド2T内服(15時) 午後7時洗腸(GE60ml)	午前7時洗腸(GE60ml) 胃管挿入(Fr cm) 末梢確保(G) 部位() ヴィーン F 500ml Ns100 + セフメタゾン1g 弾性ストッキング(有・無) 血液型バンド ブレメデ (時 分) 内容: 硫酸アトロピン mg ドルミカム mg 手術室入室 (時 分)	
臨時処置									
説明・指導					病棟オリエンテーション 術前オリエンテーション 入院治療計画書		主治医説明 麻酔科医説明 手術室看護師説明 手術麻酔申込書 血液製剤同意書(有・無)	同意書の確認(手術、血液製剤)	
看護目標							1 手術に対する理解がなされている		
看護特記事項									
バリアンス					(あり・なし)	(あり・なし)	(あり・なし)	(あり・なし)	
サイン					日 準	日 準	日 準	日 準	

個人的背景
1、家族構成

2、危険度

3、褥創

連絡先

前処置・除毛範囲

剣状突起から臍下4横指まで
左大腿部15cm四方まで

既往歴・合併症等

アレルギー等

特記事項

約束指示
発熱時;
A: ボルタレンSP 25mg/50mg
B: メチロン 1A im

疼痛時;
C: ロピオン0.5A/1A+Ns50/100ml div
D: ボルタレンSP 25mg/50mg
E: ソセゴン 15mg im

嘔気時;
F: プリンペラン 1A iv
G: アタラックスP 25mg・50mg iv

不眠時;
H: レンドルミン(0.25) 1T p.o
I: アタラックスP 25mg・50mg iv
J: セレネース 1A+Ns50/100ml div

不穏時;
K: アタラックスP 25mg・50mg iv
L: セレネース 1A iv
M: サイレース0.5/1A+Ns50/100ml div
N: ホリゾン 5/10mg im

内服薬記載欄

術後補液
5%EL3号 500ml + ガスター1A

5%EL3号 500ml + SMC1A

5%EL3号 500ml + ガスター1A

5%EL3号 500ml + SMC1A

バリアンスの記載について
軽度(点滴の追加など);
……書き込んで色鉛筆で囲む

中等度(嘔吐頻回、点滴除去など);
……看護特記事項欄に記入する

重大(ショック、出血、呼吸不全など);
……直ちに観察表に移す

DrよりPt、Famへ術前説明

__月 __日 __時予定

尿量チェック
尿量8時間で300ml以下であれば

ヴィーン F 500ml div

ラシックス10/20mg iv

Dr指示確認
クリパスに順ずる

指示変更あり
Drサイン()

Nsサイン()

腹腔鏡下胆嚢摘出術 (術後～1日目)

患者: _____ 様

No. _____

帰室時間				手術当日(手術後) 月 日								手術1日目(術後～回診) 月 日								手術1日目(午後)															
T	P	R	BP																																
バイタルサイン	40	110	40	180																															
	39	100	35	160																															
	38	90	30	140																															
	37	80	25	120																															
	36	70	20	100																															
	35	60	15	80																															
	34	50	10	60																															
安静度				ベッド上、体位変換可								ベッド上、体位変換可								トイレ歩行可															
食事				絶飲食								絶飲食								飲水可、食事伝票確認															
清潔				清拭								清拭								清拭															
HRモニター																																			
SpO2																																			
帰室時間				帰室時	15分後	30分後	1時間後				18時	20時	22時	0時	2時	4時	バランスチェック		6時	8時	10時	12時	14時	16時	18時	20時	22時	0時							
麻酔覚醒状態																				IN															
冷感/チアノーゼ																				メイン															
肺雑音/呼吸音																				側注															
胸痛/呼吸苦																				トータル															
創痛																				OUT															
腹満/腸蠕動																				胃管															
ガーゼ交換																				尿管															
ドレーン(有・無)/性状																				尿量															
胃管				_____ ml破棄																_____ ml		_____ ml 破棄													
排泄				排便 / 排ガス																尿量															
				_____ ml破棄																_____ ml															
治療・処置				創部確認(帰室時) 酸素(L % : 開始) 胸腹部X-p CBC、Po-1 BGA問題なければAライン抜去 5%EL3号 500ml + ガスター1A								創部確認(20時) 酸素投与終了(21時) 5%EL3号 500ml + SMC1A Ns100 + セフメタゾン1g								創部確認 8時間尿チェック 5%EL3号 500ml + ガスター1A								創部確認(Dr回診) 起床時胃管抜去 清拭時バルン抜去 胸腹部X-p CBC、Po-1 5%EL3号 500ml + SMC1A (終了抜針) 吸入 吸入							
臨時処置				(:) _____ 効果() (:) _____ 効果()								(:) _____ 効果() (:) _____ 効果()								(:) _____ 効果() (:) _____ 効果()															
説明・指導				術後説明								回診後飲水摂取可能								トイレ洗面歩行可能															
看護目標				#2合併症の早期発見 #3苦痛の軽減 #4セルフケア不足による不満の軽減								#2合併症の早期発見 #3苦痛の軽減 #4セルフケア不足による不満の軽減																							
看護特記事項																																			
バリエーション				(あり・なし)								(あり・なし)								(あり・なし)															
サイン				日								準								深															

腹腔鏡下胆嚢摘出術 (2日目～退院まで)

患者: _____ 様

No. _____

					手術2日目 月 日	手術3日目 月 日	手術4日目 月 日	手術5日目 月 日	手術 日目 月 日
バイタルサイン	T	P	R	BP					
	40	110	40	180					
	39	100	35	160					
	38	90	30	140					
	37	80	25	120					
	36	70	20	100					
	35	60	15	80					
	34	50	10	60					
安静度									
食事									
清潔					清拭	シャワー浴可	シャワー浴可	入浴可	
排泄	排便 / 排ガス								
	尿量 / 回数								
創痛									
治療・処置					硬膜外持続注入終了 吸入()	硬膜外チューブ抜去 ドレーン抜去 胸腹部X-p CBC、Po-1 吸入()			
臨時処置									
説明・指導						創部保護の上シャワー浴可能		退院説明 退院時処方確認	
看護目標					#5スムーズに離床できる	#6セルフケアに自信が持てる	#6セルフケアに自信が持てる		
看護特記事項									
バリアンス					(あり・なし)	(あり・なし)	(あり・なし)		
サイン					深 日 準	深 日 準	深 日 準	深 日 準	深 日 準

▼退院時処方記載欄

